

LINEA COMPI

# SOLFATO FERROSO PLUS

CONCIME MISCELA DI MICROELEMENTI

SEZIONE:  
NUTRIZIONE



COD. ART.	CONFEZIONE	PZ/CRT	VENDITA	IVA
406170	1 Kg	12 pz	L V	4
406171	5 Kg	4 pz	L V	4
406172	5 Kg	60 pz	L V	4

## COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	12%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,6%
Ossido di magnesio (MgO) totale	5%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	3%
Anidride solforica (SO <sub>2</sub> ) solubile in acqua	34%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto - Non superare le dosi appropriate.

## CARATTERISTICHE

COMPI SOLFATO FERROSO PLUS è un concime granulare appositamente formulato per apportare al terreno ferro e zolfo in forma facilmente assimilabile indispensabili per prati, ortaggi, piante ornamentali e da frutta. È un concime granulare particolare contenente un'elevata quantità di ferro di immediato assorbimento ideale per prevenire e curare la clorosi ferrica. Apportando al terreno magnesio e manganese restituisce quanto prelevato dalle piante e previene malattie da carenza. La reazione acida favorisce una notevole efficacia nel controllo del muschio.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno in primavera.

Una manciata di prodotto corrisponde a circa 60g.

- **Orti e aiuole da fiore:** distribuire uniformemente sul terreno o interrare leggermente nella dose di 60-120g/m<sup>2</sup> (pari a 1-2 manciate) a seconda delle specie trattate; successivamente innaffiare. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni.
- **Cespugli e siepi:** distribuire 50-6 g (paria a circa 1 manciata) per pianta a seconda della dimensione sulla superficie o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere, se necessario, dopo 15 giorni.
- **Alberi e piante da frutto:** distribuire 100g/m<sup>2</sup> (pari a circa 1,5 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Ripetere il trattamento, se necessario, dopo 15 giorni.
- **Prati:** azione rinverdente: distribuire 50g/m<sup>2</sup> (pari circa a 1 manciata scarsa); successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 3-4 settimane. Controllo del muschio: distribuire 25g/m<sup>2</sup> (pari a circa mezza manciata scarsa) per trattamenti preventivi, 50g/m<sup>2</sup> (pari circa a 1 manciata scarsa) per trattamenti curativi; successivamente innaffiare. Trattare in primavera ogni 15 giorni.

## CLASSIFICAZIONE (FRASI H)

H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

## OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA

SI



ATTENZIONE